

Vejledning til patienter med diabetes:

Diabetes 1:

Fastebldsukker måles hjemme om morgenen. Medbring eget blodsukkerapparat.

Det tilstræbes, at blodsukkeret ligger mellem 4 og 12.

Blodsukker under 4: Drikkes et glas sødt saft

Blodsukker mellem 4 og 12: Kan man drikke et glas vand

Blodsukker over 12: Skal der gives 2 e.i. insulin med pen

Blodsukker over 16: Kontakt klinikken

Insulin-pen medbringes til klinikken.

Blodsukkeret vil blive målt under indgrebet, hvis varigheden af behandlingen er over en time, samt efter behandlingen. Husk derfor eget blodsukkerapparat.

Det er vigtigt, at du drikker og spiser hurtigt efter behandlingen for at indstille dig til dit normale insulinbehov.

Diabetes 2:

Fastebldsukker måles hjemme om morgenen. Medbring dit eget blodsukkerapparat.

Blodsukker under 4: Drikkes et glas sødt saft

Blodsukker mellem 4 og 12: Kan man drikke et glas vand

Blodsukker over 12: Tages den sædvanlige morgendosis af diabetes tabletter.

Blodsukker over 16: Kontakt klinikken

Blodsukkeret vil blive målt under indgrebet, hvis varigheden af behandlingen er over en time, samt efter behandlingen. Husk derfor eget blodsukkerapparat.

Insulin im/glucose gives afhængig af måleværdier.

Det er vigtigt, at du drikker og spiser hurtigt efter behandlingen for at indstille dig til dine vanlige antidiabetes tabletter.